

CIRUGÍA MINI INVASIVA · UMIBA

Orquidopexia

Usted se esta por someter a una orquidopexia. Esta cirugía consiste en la fijación del testículo. Esta técnica permite lograr excelentes resultados con mínima convalecencia.

Preparación

Es importante la correcta preparación antes de la cirugía

- No debe tomar aspirina 10 días antes de la cirugía.
- Debe concurrir el día de la cirugía con 8 hs de ayuno (nada por boca). De tomar medicación por la mañana, puede hacerlo ingiriendo un sorbo de agua.
- Concurra con todas las imágenes, el prequirúrgico completo y la autorización de la obra social.
- No debe rasurarse el área.
- Usted se internará varias horas antes de su cirugía.

Postoperatorio

Al despertar de la cirugía usted permanecerá en observación unas 4 horas. Durante este tiempo se recuperará de la anestesia. De estar en condiciones será dado de alta el mismo día.

- No debe realizar esfuerzos y deberá realizar un reposo estricto los primeros días.
- Las heridas las debe lavar con agua y jabón y deben permanecer descubiertas. Es normal la secreción por la zona, hematoma, picazón y aumento de sensibilidad.
- Los puntos se caen solos.
- Retome su medicación habitual.
- La dieta debe ser variada evitando constipantes.
- Se le darán analgésicos por si tiene dolor.
- Puede tomar alcohol.

Complicaciones

La orquidopexia tiene muy bajo índice de complicaciones. No obstante pueden producirse un hematoma. En toda cirugía existe posibilidad de infección de heridas. Se realizará un control a la semana y al mes postoperatorio.

VER EL PROCEDIMIENTO

[umiba.org/procedimientos/ →](https://umiba.org/procedimientos/)

CONSULTAS Y TURNOS

[umiba.org/contacto/ →](https://umiba.org/contacto/)