

CIRUGÍA MINI INVASIVA · UMIBA

Varicocelectomía bilateral laparoscópica

Usted se esta por someter a una varicocelectomía bilateral por vía laparoscópica. Esta cirugía consiste en la ligadura y sección de las venas gonadales (venas que retornan la sangre desde los testículos). El objetivo de la misma es intentar el control bilateral del varicocele y por consiguiente el deterioro de la función espermática. El abordaje laparoscópico consiste en realizar la cirugía utilizando puertos de entrada (trocares) para acceder a la cavidad abdominal a través de mínimas incisiones. Esta técnica permite lograr excelentes resultados con mínima convalecencia.

Preparación

Es importante la correcta preparación antes de la cirugía

- No debe tomar aspirina 10 días antes de la cirugía.
- Debe comprar en una ortopedia un par de medias antitrombóticas para cirugía. El largo debe ser hasta la ingle y la compresión media.
- Debe concurrir el día de la cirugía con 8 hs de ayuno (nada por boca). De tomar medicación por la mañana, puede hacerlo ingiriendo un sorbo de agua.
- Concurra con todas las imágenes, el prequirúrgico completo y la autorización de la obra social.
- Usted se internará varias horas antes de su cirugía.
- Debe orinar antes de ser llevado a quirófano

Postoperatorio

Será dado de alta el día de la cirugía luego de haber retomado la ingesta y la deambulacion.

- No debe realizar esfuerzos.
- Podrá conducir a los tres días de ser operado.
- Las heridas las debe lavar con agua y jabón y deben permanecer descubiertas.
- Los puntos se caen solos.
- Retome su medicación habitual.
- La dieta debe ser variada evitando constipantes.
- Se le darán analgésicos por si tiene dolor, tendrá dolor de hombros durante 2 a 3 días. Este está causado por el gas que se utiliza durante la cirugía.
- Puede tomar alcohol.
- No obstante el éxito de la cirugía usted podrá palpar la persistencia de las venas.

Complicaciones

Aunque muy infrecuente, pueden ocurrir sangrados intraoperatorios que requieran la prolongación de la internación evitando el alta en el mismo día. Como en todo procedimiento, existe la posibilidad de infección. De suceder esto, usted requerirá de antibioticoterapia durante el postoperatorio.

VER EL PROCEDIMIENTO

[umiba.org/procedimientos/ →](https://umiba.org/procedimientos/)

CONSULTAS Y TURNOS

[umiba.org/contacto/ →](https://umiba.org/contacto/)