

CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA · UMIBA

Orquidopexia

Você fará uma orquidopexia. O procedimento consiste na fixação do testículo. Essa técnica alcança excelentes resultados com convalescença mínima.

Preparação

A preparação correta antes da cirurgia é importante.

- Não tome aspirina nos 10 dias anteriores à cirurgia.
- Compareça no dia da cirurgia com 8 horas de jejum (nada por via oral). Se tomar medicação pela manhã, faça-o com um pequeno gole de água.
- Compareça com todos os exames de imagem, a avaliação pré-cirúrgica completa e a autorização do convênio.
- Não raspe a região.
- Você será internado várias horas antes da cirurgia.

Pós-operatório

Ao acordar da cirurgia, você permanecerá em observação por cerca de 4 horas, recuperando-se da anestesia. Se estiver em condições, receberá alta no mesmo dia.

- Evite esforços e mantenha repouso rigoroso nos primeiros dias.
- Lave as feridas com água e sabão e mantenha-as descobertas. É normal haver secreção na região, hematoma, coceira e aumento da sensibilidade.
- Os pontos caem sozinhos.
- Retome sua medicação habitual.
- Mantenha uma dieta variada, evitando alimentos que causam constipação.
- Serão fornecidos analgésicos caso sinta dor.
- Você pode consumir álcool.

Complicações

A orquidopexia tem um índice de complicações muito baixo. Ainda assim, pode ocorrer um hematoma, e há possibilidade de infecção da ferida em qualquer cirurgia. Serão feitas consultas de controle uma semana e um mês após o procedimento.

VER O PROCEDIMENTO

[umiba.org/procedimentos/ →](https://umiba.org/procedimentos/)

CONSULTAS E AGENDAMENTOS

[umiba.org/contato/ →](https://umiba.org/contato/)