

CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA · UMIBA

Ressecção transuretral da próstata

bipolar - TURIS

Procedimento

Você fará uma ressecção transuretral da próstata bipolar com o sistema TURIS da Olympus. O procedimento remove o adenoma da próstata pela uretra usando um eletrodo bipolar de forma esférica que se acende formando uma coroa de plasma. Além de vaporizar o tecido, é possível, antes, retirar fragmentos dele com uma alça circular para obter amostras para análise, caso o caso exija. A vaporização com plasma é um procedimento inovador que oferece ao paciente o máximo grau de segurança, sendo tão eficaz quanto a opção de tratamento padrão. Também permite tratar grandes volumes prostáticos de forma minimamente invasiva, com recuperação rápida.

Preparação

A preparação correta antes da cirurgia é importante.

- Não tome aspirina nos 7 dias anteriores à cirurgia.
- Compre em uma loja de material ortopédico um par de meias antitrombóticas para cirurgia. Devem chegar até a virilha e ter compressão média.
- Compareça no dia da cirurgia com 8 horas de jejum (nada por via oral). Se tomar medicação pela manhã, faça-o com um pequeno gole de água.
- Compareça com a avaliação pré-cirúrgica completa.
- Você será internado várias horas antes da cirurgia.

Pós-operatório

Ao acordar da cirurgia, você estará com uma sonda vesical. Ela será retirada no dia seguinte, antes da alta.

Cuidados pós-operatórios

- Evite esforços.
- Você poderá dirigir uma semana após a cirurgia.
- Retome sua medicação habitual.
- Mantenha uma dieta variada, evitando alimentos que causam constipação.
- Você pode consumir álcool.
- Sua frequência urinária aumentará por algumas semanas, e você terá episódios de urgência (vontade súbita de urinar). Eles desaparecerão gradualmente.
- Na semana seguinte, faça uma urocultura de controle.
- O volume ejaculatório diminuirá consideravelmente.

Complicações

Esse tipo de cirurgia caracteriza-se por pouco sangramento e índice de complicações muito baixo. Ainda assim, pode ocorrer sangramento passageiro no pós-operatório, que cede ao aumentar a ingestão de líquidos. Há possibilidade de infecção em qualquer cirurgia da via urinária; se ocorrer, você precisará de antibioticoterapia no pós-operatório.

VER O PROCEDIMENTO

umiba.org/procedimentos/ →

CONSULTAS E AGENDAMENTOS

umiba.org/contato/ →