

CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA · UMIBA

Varicocelelectomia bilateral laparoscópica

Você fará uma varicocelelectomia bilateral por via laparoscópica. O procedimento consiste na ligadura e secção das veias gonadais (as veias que trazem o sangue de volta dos testículos), com o objetivo de controlar a varicocele dos dois lados e, com isso, a piora da função espermática. Na abordagem laparoscópica, a cirurgia é feita por portais de entrada (trocarteres) que acessam a cavidade abdominal por incisões mínimas. Essa técnica alcança excelentes resultados com convalescença mínima.

Preparação

A preparação correta antes da cirurgia é importante.

- Não tome aspirina nos 10 dias anteriores à cirurgia.
- Compre em uma loja de material ortopédico um par de meias antitrombóticas para cirurgia. Devem chegar até a virilha e ter compressão média.
- Compareça no dia da cirurgia com 8 horas de jejum (nada por via oral). Se tomar medicação pela manhã, faça-o com um pequeno gole de água.
- Compareça com todos os exames de imagem, a avaliação pré-cirúrgica completa e a autorização do convênio.
- Você será internado várias horas antes da cirurgia.
- Urine antes de ser levado ao centro cirúrgico.

Pós-operatório

Você receberá alta no dia da cirurgia após retomar a alimentação e a deambulação.

- Evite esforços.
- Você poderá dirigir três dias após a cirurgia.
- Lave as feridas com água e sabão e mantenha-as descobertas.
- Os pontos caem sozinhos.
- Retome sua medicação habitual.
- Mantenha uma dieta variada, evitando alimentos que causam constipação.
- Serão fornecidos analgésicos caso sinta dor; você terá dor nos ombros por 2 a 3 dias. Ela é causada pelo gás utilizado durante a cirurgia.
- Você pode consumir álcool.
- Mesmo com o sucesso da cirurgia, você poderá palpar a persistência das veias.

Complicações

Embora muito incomum, pode ocorrer sangramento durante a cirurgia que prolongue a internação e impeça a alta no mesmo dia. Como em qualquer procedimento, há possibilidade de infecção; se ocorrer, você precisará de antibioticoterapia no pós-operatório.

VER O PROCEDIMENTO

[umiba.org/procedimentos/ →](https://umiba.org/procedimentos/)

CONSULTAS E AGENDAMENTOS

[umiba.org/contato/ →](https://umiba.org/contato/)